

【レジメン一覧】肉腫

最終更新：2025.11.25

レジメン名称	薬品名称	投与量	スケジュール	投与間隔
AIM療法(ADR30mg/m ² × 2日) 3週毎	ドキソルビシン	30 mg/m ²	day1,2	3週間
	イホスファミド	2000 mg/m ²	day1～5	
DXR bolus 60:6コースまで	ドキソルビシン	60 mg/m ²	day1	3週間
DXR bolus 75:6コースまで	ドキソルビシン	75 mg/m ²	day1	3週間
DTX+GEM(ドセタキセル・ゲムシタビン)療法	ゲムシタбин	900 mg/m ²	day1,8	3週間
	ドセタキセル	70 mg/m ²	day8	
Eribulin療法:肉腫:q3w	エリプリン	1.4 mg/m ²	day1,8	3週間
VAC療法(CPA2.2g/m ²)	ピンクリスチン	1.5 mg/m ²	day1,8,15	3週間
	アクチノマイシンD	0.045 mg/kg	day1	
	シクロホスファミド	2200 mg/m ²	day1	
weekly-PTX:血管肉腫 6コースまで	パクリタキセル	80 mg/m ²	day1,8,15	4週間
ヨンデリス単独療法:中心静脈ルート必要	トラベクテジン	1.2 mg/m ²	day1	3週間
ドキソルビシン+シスプラチニ療法(骨肉腫;成人用)	シスプラチニ	100 mg/m ²	day1	3週間
	ドキソルビシン	20 mg/m ²	day1～3	
Ewing肉腫				
レジメン名称	薬品名称	投与量	スケジュール	投与間隔
IE療法:最大8回:VAC/IE交換療法	エトポシド	100 mg/m ²	day1～5	3週間
	イホスファミド	1800 mg/m ²	day1～5	