

## 【レジメン一覧】卵巣がん

最終更新：2025.11.30

レジメン名称	薬品名称	投与量	スケジュール	投与間隔
BEV(15mg/kg)療法 q3w	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	3週間
BEV+GEM+CBDCA	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	3週間
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
	カルボプラチニ	AUC=4	day1	
CBDCA療法	カルボプラチニ	AUC=6	day1	3週間
CDDP+CPT-11(シスプラチニ・イリノテカニ)療法	イリノテカニ	60 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週間
	シスプラチニ	70 mg/m <sup>2</sup>	day1	
GEM療法	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	4週間
GEM+BEV療法	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	3週間
	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8	
GEM+CBDDCA療法(卵巣癌・卵管癌・腹膜癌)	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	day1,8	3週間
	カルボプラチニ	AUC=4	day1	
DC(DTX+CBDDCA)療法	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	day1	3週間
	カルボプラチニ	AUC=6	day1	
DC+BEV療法	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	3週間
	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	day1	
	カルボプラチニ	AUC=6	day1	
dose-dense TC療法	バクリタキセル	80 mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15	3週間
	カルボプラチニ	AUC=6	day1	
DTX療法	ドセタキセル	70 mg/m <sup>2</sup>	day1	3週間
ETP+CDDP(エトボシド・シスプラチニ)療法	エトボシド	100 mg/m <sup>2</sup>	day1~3	3週間
	シスプラチニ	80 mg/m <sup>2</sup>	day1	
NDP(ネダプラチニ)療法	ネダプラチニ	100 mg/m <sup>2</sup>	day1	4週間
PLD-C(ドキシル・カルボプラチニ)療法	ドキソルビシン(リポソーム製剤)	30 mg/m <sup>2</sup>	day1	3週間
	カルボプラチニ	AUC=5	day1	
PTX180mg/m <sup>2</sup> q3w 療法	バクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	day1	3週間
TC療法	バクリタキセル	180 mg/m <sup>2</sup>	day1	3週間
	カルボプラチニ	AUC=6	day1	
TC+BEV療法	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	3週間
	バクリタキセル	175 mg/m <sup>2</sup>	day1	
	カルボプラチニ	AUC=6	day1	
ドキシル(Doxil)療法	ドキソルビシン(リポソーム製剤)	50 mg/m <sup>2</sup>	day1	4週間
ドキシル+BEV療法	ドキソルビシン(リポソーム製剤)	50 mg/m <sup>2</sup>	day1	4週間
	ペバシズマブ	15 mg/kg	day1	