

【レジメン一覧】絨毛がん

最終更新：2025.11.30

レジメン名称	薬品名称	投与量	スケジュール	投与間隔
ACT-D(アクチノマイシンD)療法	アクチノマイシンD	0.5 mg/body	day1～5	2週間
EMA/CO療法	アクチノマイシンD	0.5 mg/body	day1,2	2週間
	エトポシド	100 mg/m ²	day1,2	
	メトトレキサート	300 mg/m ²	day1	
	ピンクリスチン	1 mg/m ²	day8	
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	day8	
EP/EMA療法	エトポシド	day1: 150 mg/m ² , day8: 100 mg/m ²	day1,8	2週間
	シスプラチニン	75 mg/m ²	day1	
	アクチノマイシンD	0.5 mg/body	day8	
	メトトレキサート	300 mg/m ²	day8	
MEA療法	メトトレキサート（急速静注）	150 mg/body	day1	2週間
	メトトレキサート（持続注入）	300 mg/body	day1	
	アクチノマイシンD	0.5 mg/body	day1～4	
	エトポシド	100 mg/m ²	day1～4	
TP/TE療法	パクリタキセル	135 mg/m ²	day1,15	4週間
	シスプラチニン	60 mg/m ²	day1	
	エトポシド	150 mg/m ²	day15	