

## 【レジメン一覧】膵がん

最終更新：2025.12.9

| 進行再発             |                      |                        |           |      |
|------------------|----------------------|------------------------|-----------|------|
| レジメン名称           | 薬品名称                 | 投与量                    | スケジュール    | 投与間隔 |
| FOLFIRINOX       | オキサリプラチン             | 85 mg/m <sup>2</sup>   | day1      | 2週間  |
|                  | レボホリナート              | 200 mg/m <sup>2</sup>  | day1      |      |
|                  | イリノテカン               | 180 mg/m <sup>2</sup>  | day1      |      |
|                  | フルオロウラシル (急速静注)      | 400 mg/m <sup>2</sup>  | day1      |      |
|                  | フルオロウラシル (持続注入：46時間) | 2400 mg/m <sup>2</sup> | day1      |      |
| GEM療法(胆・膵がん)     | ゲムシタビン               | 1000 mg/m <sup>2</sup> | day1,8,15 | 4週間  |
| GEM療法(胆・膵がん)q3w  | ゲムシタビン               | 1000 mg/m <sup>2</sup> | day1,8    | 3週間  |
| GEM+nab-PTX(膵がん) | バクリタキセル (アルブミン懸濁型)   | 125 mg/m <sup>2</sup>  | day1,8,15 | 4週間  |
|                  | ゲムシタビン               | 1000 mg/m <sup>2</sup> | day1,8,15 |      |
| nal-IRI+5FU/LV   | イリノテカン (リポソーム製剤)     | 70 mg/m <sup>2</sup>   | day1      | 2週間  |
|                  | レボホリナート              | 200 mg/m <sup>2</sup>  | day1      |      |
|                  | フルオロウラシル (持続注入：46時間) | 2400 mg/m <sup>2</sup> | day1      |      |